

# PANTOTHEN

Pharmaselect 5%-Salbe

## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR PATIENTEN

### Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe

Wirkstoff: Dexpanthenol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe beachten?
3. Wie ist Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

## 1. WAS IST PANTOTHEN PHARMASELECT 5%-SALBE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die als Wundbehandlungsmittel bezeichnet werden. Der in Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe enthaltene Wirkstoff Dexpanthenol wird in den Zellen des Körpers rasch in Pantothen säure umgewandelt. Pantothen säure ist notwendig für den Aufbau von Haut- und Schleimhäuten.

Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe wird zur äußerlichen Behandlung von Wunden und Entzündungen von Haut und Schleimhäuten angewendet, wie zum Beispiel:

- Sonnenbrand, leichte Hautverletzungen, Schürfwunden, Analfissuren (Rissen am After), Brandwunden, zur Förderung des Gewebewachstums nach Verbrennungen;
- zur Verhütung und Behandlung von Wunden Brustwarzen;
- in der Säuglingspflege zur Verhütung und Heilung von Wundsein; unterstützend bei Hautschäden (zur Vorbeugung und Behandlung von Strahlenschäden, z. B. Röntgenstrahlen), Hauttransplantationen, Dekubitus (Wundliegen), chronischen Hautgeschwüren, Schleimhautdefekten am Muttermund.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON PANTOTHEN PHARMASELECT 5%-SALBE BEACHTEN?

**Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie allergisch gegen Dexpanthenol, gegenüber Erdnuss oder Soja oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe sind.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe anwenden.
- Wenn Sie Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe im Genital- oder Analsbereich anwenden, kann es wegen des Hilfsstoffes weißes Vaseline bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.
- bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

### Anwendung von Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe enthält Hydroxybenzoesäuremethylester, Butylhydroxytoluol, Lanolin, Cetylstearylalkohol und Erdnussöl**

Hydroxybenzoesäuremethylester kann allergische Reaktionen hervorrufen. Butylhydroxytoluol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen. Lanolin und Cetylstearylalkohol können örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Pantothен Pharmaselect 5%-Salbe enthält Erdnussöl. Es darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Erdnuss oder Soja sind.

### 3. WIE IST PANTOTHEN PHARMASELECT 5%-SALBE ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Pantothene Pharmaselect 5%-Salbe wird 1-2-mal täglich dünn auf die erkrankten Stellen aufgetragen.

Wunde Brustwarzen: unmittelbar nach jedem Stillen mit Salbenkompressen bedecken.

#### **Anwendung bei Kindern**

In der Säuglingspflege: nach jedem Trockenlegen auftragen.

Zur Anwendung auf der Haut.

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung bzw. wird von Ihrem Arzt festgelegt werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Pantothene Pharmaselect 5%-Salbe angewendet haben, als Sie sollten:**

Überdosierung und Intoxikationen (Vergiftungen) bei bestimmungsgemäßer Anwendung oder nach versehentlicher Einnahme sind nicht zu erwarten.

Bei versehentlicher Einnahme großer Mengen von Pantothene Pharmaselect 5%-Salbe informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Pantothene Pharmaselect 5%-Salbe vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

#### **Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes:**

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen): Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von Kontaktallergien.

#### **Meldung von Nebenwirkung**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. WIE IST PANTOTHEN PHARMASELECT 5%-SALBE AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25°C lagern!

Nach dem ersten Öffnen 6 Monate haltbar.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube nach "Verwendbar bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie das Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

### 6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

#### **Was Pantothene Pharmaselect 5%-Salbe enthält:**

Der Wirkstoff ist: Dexpanthenol, 1 g Salbe enthält 50 mg Dexpanthenol.

1 cm Salbe der 30g bzw. 130g Packung enthält 13mg bzw. 18mg Dexpanthenol.

Die sonstigen Bestandteile sind: p-Hydroxybenzoesäuremethylester, Butylhydroxytoluol, weißes Vaseline, Cera alba, Lanolin, Cetylstearylalkohol, raffiniertes Erdnussöl, hydriertes Erdnussöl, Paraffin solidum, Paraffinum liquidum, Wollwachsalkohole, Inwitor 780K, Cetiol V, gereinigtes Wasser.

#### **Wie Pantothene Pharmaselect 5%-Salbe aussieht und Inhalt der Packung**

Pantothene Pharmaselect 5%-Salbe ist eine cremefarbene, homogene Salbe.

Pantothene Pharmaselect 5%- Salbe ist in Aluminiumtuben mit Innenschutzlackierung und Schraubverschluss zu 30 g und 130 g erhältlich.

Zum ersten Öffnen Dorn der Schraubkappe durch die Tubenmembran drücken.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

##### **Pharmazeutischer Unternehmer:**

Zulassungsinhaber: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Wien

Vertrieb: Pharmaselect Handels GmbH, Wien

**Hersteller:** Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Wien

Z. Nr.: 11.397

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2018.