

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1.

Was sind Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA und wofür werden sie angewendet?

2.

Was sollten Sie vor der Anwendung von Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA beachten?

3.

Wie sind Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA anzuwenden?

4.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

5.

Wie sind Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA aufzubewahren?

6.

Inhalt der Packung und weitere Informationen

1.

Was sind Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA und wofür werden sie angewendet?

Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA ist eine homöopathische Arzneispezialität der anthroposophischen Therapierichtung.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:
Harmonisierung der Stoffwechselprozesse im Auge, z.B. bei trockenem Auge, Reiz- und Ermüdungszuständen.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA werden angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr.

Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2.

Was sollten Sie vor der Anwendung von Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA beachten?

Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA dürfen nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Chelidonium majus e radice ferm 34b, Chelidonium majus ex herba ferm 34b, Rosa e floribus ferm cum Ferro, Ruta graveolens ex herba ferm 33c, Terebinthina larcina oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA anwenden.

Vor der Anwendung des Arzneimittels sollte eine Untersuchung durch einen Augenarzt erfolgen. Bei starken Schmerzen im Bereich der Augen oder einem plötzlichen Nachlassen des Sehvermögens ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Kinder unter 1 Jahr

Die Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Anwendung von Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Anwendung von Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor. Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

3.

Wie sind Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 1 Jahr:

2- bis 3-mal wöchentlich, in akuten Fällen bis 2-mal täglich 1 Tropfen.

Art der Anwendung:

Zur Anwendung am Auge, in den Bindehautsack einträufeln.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr

Die Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA sind auch für Kontaktlinsenträger geeignet.

Wenn Sie eine größere Menge von Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA angewendet haben als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Anwendung von Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Anwendungshinweis

Abbildung 1

Öffnen: Ein Behältnis vom Riegel abtrennen und durch Abdrehen des flachen Flügels öffnen.

Abbildung 2

Tropfanleitung: Kopf nach hinten neigen. Mit dem Zeigefinger einer Hand das Unterlid des Auges leicht nach unten ziehen. Mit der anderen Hand einen Tropfen der Flüssigkeit durch leichten Fingerdruck auf das Behältnis in den Bindehautsack dosieren.

Einzeldosisbehältnis nicht mit dem Auge in Berührung bringen!

Danach das Auge möglichst offen halten und bewegen, damit sich die Flüssigkeit gut verteilt.

4.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In wenigen Fällen wurde über lokale Überempfindlichkeits- und Unverträglichkeitsreaktionen wie z.B. Rötung der Augen berichtet.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Trisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5.

Wie sind Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Einzeldosisbehältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Die Augentropfen in den Einzeldosisbehältnissen sind nach dem Öffnen nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die nach der Anwendung in dem Behältnis verbleibende Restmenge darf nicht mehr verwendet werden.

Die auf dem Einzeldosisbehältnis befindliche Kennzeichnung „EXP.“ entspricht dem Verfalldatum „Verw. bis.“ und „LOT.“ entspricht der Chargenbezeichnung „Ch.-B.“.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA enthalten

1 Einzeldosisbehältnis enthält:

Wirkstoffe:

- Chelidonium majus e radice ferm 34b Dil. D3 0,017 g
- Chelidonium majus ex herba ferm 34b Dil. D3 0,033 g
- Rosa e floribus ferm cum Ferro Dil. D3 0,05 g
- Ruta graveolens ex herba ferm 33c Dil. D3 0,05 g
- Terebinthina laricina Dil. D5 0,05 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke.

Wie Chelidonium comp. Einzeldosis Augentropfen WALA aussehen und Inhalt der Packung

Klare, farblose Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis aus transparentem Kunststoff, Inhalt 0,5 ml.

Packungsgrößen: 5 und 30 Einzeldosisbehältnisse zu 0,5 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

WALA Heilmittel GmbH

Dorfstr. 1

73087 Bad Boll/Eckwälden

DEUTSCHLAND

Tel. +49(0)7164 930-181

Fax +49(0)7164 930-297

info@wala.de

Hersteller

WALA Heilmittel GmbH
Badwasen 2
73087 Bad Boll
DEUTSCHLAND

Zul.-Nr.:339069

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2021.
